

HANELISTE MÄÄRAMISE JUHEND

Haneliste seltsi partlaste sugukonda kuuluvad lisaks hanedele ja lagledele ka luiged, pardid ja kosklad. Käesolevas juhendis keskendume ainult hanedele ja lagledele, kelle täpne määramine on haneliste heidutusjahi uuringu raames äärmisel oluline. Küttida ei tohi liike, kellele jahiluba pole väljastatud. Looduskaitsealused haned ja lagled Eestis on **väike-laukhani** (I kaitsekategooria), **valgepösk-lagle** (III kaitsekategooria) ja **punakael-lagle** (III kaitsekategooria).

Liikide määramine

Käesolevat hanede ja laglede määramise juhendit on lubatud kasutada ainult teaduslikel ja mittekommertsiaal eesmärkidel lindude määramise lihtsustamiseks. Järgnevalt on toodud liikide määramise üldtabel, millele järel käsitletakse igat liiki üksikasjalikumalt.

HANEDE JA LAGLEDE MÄÄRAMISE JUHEND

Pöldudel kohatavaid hanelisi saab välimuse ja suuruse põhjal laias laastus jagada

üldpildilt pruunikad hanelised,
noka ja jalade värv varieerub
roosast oranžini (haned)

→ KODUHANE SUURUSED

→ Hallhani



vt joonis 1.

→ Rabahaned



vt joonis 2.

→ KODUHANEST VÄIKSEMAD


Valge lauk puudub

Lühinokk-hani



vt joonis 3.

Noka kohal valge lauk



vt joonis 4.

mustjashallid hanelised valgete laikudega,
ühel juhul kaelal lisaks ka punakaspruuni
nokk ja jalad on mustad (lagled)

→ KODUHANE SUURUSED

→ Kanada lagle



vt joonis 8.

→ KODUHANEST VÄIKSEMAD

Valgepösk-lagle



vt joonis 6.

Mustlagle



vt joonis 7.

Punakael-lagle



vt joonis 5.

1. HALLHANI (*Anser anser*)

Sulestik

Üleni pruunikashall. Kõhuosa on heledam, vanematel lindudel võib esineda kõkul väikesi tumedamaid laike. Kuid üldmulje on siiski pigem tagasihoidlik, ilma eriliste triipude või muude kaunistusteta.

Lennul paistab silma **heledam tiiva eesserv**
(helehall, aga võib tunduda päikesevalguses suisal valge).



Suurus Kõige suurem meil esinev hani (2,5-4,3 kg).

Häälitus Ninahäälne kaikuv kaagutus „kaang, ka-nga-nga-...“ nagu koduhanel.

Sarnane liik Segamini võib ajada rabahanega. Hallhane üldpilt on siiski tunduvalt heledam, eriti just pea ja kael on heledamat, samuti nokk. Erinev on ka lennuhäälitus.



Photo credit: [gilgit2](#) on [Visualhunt.com](#) / CC BY-SA



Foto: [Pixabay](#)


2. RABAHANED (*Anser fabalis*)

Sulestik

Pruunikam, tumedam kui hallhani. **Pea ja osaliselt ka kael muust sulestikust veidi tumedamat.** Ülakeha tumehallikas.

Nokk

musta-oranžikirju noka juur ja ots on mustad, vahepealne osa oranž.



Suurus Kogukas hani, kuid hallhanest siiski pisut väiksem (u 3 kg).

Häälitus Ninahäälne madal kaagutav „kaijak“ või „kajak“, ka „ngak“.

Sarnane liik Segamini võib ajada hallhanega. Rabahane üldpilt on siiski tunduvalt tumedam, pea ja kael tumepruunid, nokk otsast must. Samuti puudub hallhanele iseloomulik tiiva hele esiserv. Erinev on ka lennuhäälitsus.

Segi võib ajada ka suur-laukhane noorlinnuga, eristada saab noka värv järgi (suur-laukhanel on nokk roosa).

Rabahane nimetuse alla kuuluvad tegelikult kaks haneliiki – **taiga-rabahani** *Anser fabalis fabalis* ja **tundra-rabahani** *Anser fabalis rossicus*. Taiga-rabahane ja tundra-rabahane on raske välimuse põhjal looduses eristada. Paraku ei saa neid looduskaitselisest seisukohast ühtselt käsitleda, sest taiga-rabahane populatsioonide arvukused on langustrendis ning liik vajab kaitset. Heidutusjahi uuringu raames on mölema rabahane küttimine teaduslikel eesmärkidel lubatud. Jahimeeste poolt edastatud fotode alusel määrratakse rabahane täpsemad liigid ja saadakse aimu, milline on taiga-rabahanede osakaal. See aitab otsustada, kas edaspidi kevadisel heidutusjahil rabahane küttimislube väljastada või mitte.

Taiga-rabahani

- Tundra-rabahanega võrreldes pikem kael - väike erinevus, raske looduses määrata, sest sõltub linnu asendist.
- Tundra-rabahanega võrreldes pikem ja saledama muljega nokk ning laiem oranž nokalaik - taas pole ideaalne määramistunnus, kuna nokavärv võib suures ulatuses varieeruda.
- Suuremat kasvu ja pikem kui tundra-rabahani, mistõttu liigub maapinnal nö „luigelikumalt“.



Ron Knight - Flickr: Tundra-rabahani.



Rabahaned lennus

Photo credit: [mattisj](#) on [Visualhunt](#) / CC BY-NC-SA



Taiga-rabahani

Photo credit: [Langham Birder](#) on [Visualhunt.com](#) /CC BY-NC-ND

3. LÜHINOKK-HANI (*Anser brachyrhynchus*)

Sulestik

Hallikas, üldmulje heledam kui teistel haneldel

Nokk

silmapaistvalt **lühike**

musta värviga nokk roosa vöruga



Suurus Rabahanest natuke väiksem.


Häälitus Nagu rabahanel või pisut kõrgemad ja kimedamat.

Sarnane liik Väga väikesearvuline läbirändaja, kes sarnaneb kõige rohkem rabahanele. Viimases on lühinokk-hani väiksem ja jässakam, kael ning jalad on lühemad, pea ümaram. Selg ja tiivapealne on rabahanega vörreldes palju heledamat, mis tumeda kehakülie ja kaela kõrval pärüs hästi silma hakkab. Samuti saba tipuvööt on laiem kui rabahanel.

4. SUUR-LAUKHANI (*Anser albifrons*)

Sulestik

Pruunikashall. Pea ja kael tunduvad ülejääenud kehast tumedamat. **Valge lauk otsmikul.** Teiste hanede seast hästi äratuntav kõhul olevate **korrapäratute mustade ristitriipude järgi.**



Suurus Väiksem kui hall- või rabahani (1,5-3 kg).

Häälitus „Kliu” ja madal „kaga”. Lennul meloodiline „kaga-kligi-kaga-kligi...”.

Sarnane liik Võib segi ajada väike-laukhanega, viimane on aga väga haruldane.

Noorlinde võib segi ajada rabahanega, aga noore suur-laukhane nokk on roosa väikese musta küünisega, mitte musta-ja oranžikirju.



Suur-laukhane noorlind (vasakul) ja kanada lagle (paremal). Suur-laukhane noorlinnul on nokk suures enamuses roosa ja noka otsas on väike must küünis – noka värv aitab teda eristada rabahanedest! Lisaks on suur-laukhane kasvult rabahanedest väiksemad.

Photo credit: [Ingrid Taylar](#) on [Visual Hunt](#) / CC BY-NC



Photo credit: [jimmyedmonds](#) on [Visual Hunt](#) / CC BY-SA

5. VÄIKE-LAUKHANI (*Anser erythropus*)

Sulestik

Pruunikashall. Pea ja kael ülejää nud kehast tumedamat.

Mustad kõhuvöödid on tavaliselt väiksemad kui suur-laukhanel.

Valge lauk ulatub silmade vaheli.

NB! Noorlindidel valge lauk puudub.

Nokk

sügavroosa

kolmnurksem ja lühem

kui suur-laukhanel



Suurus Suur-lauhanest hästi natuke väiksem, komapktsem.

Häälitlus Lennus hele kila. Vinguv, mitte kaagutav „bij-viu-viu“ või „kiju“, „kiviu“, „kiliuliu“. Hoiatushüüd kiire kõrge kiunatus „ki-up“.

Sarnane liik Võib segi ajada suur-lauhanega.
Pea on ümaram, järselt tõusvama otsmikuga ja tumedam ning kael on lühem ja kompaktsem kui suur-laukhanel.

6. VALGEPÖSK-LAGLE (*Branta leucopsis*)

Sulestik

Laup, põsed, kurgu- ja kõhualune valged. Kael must. Selg hallikas, tugeva musta triibutusega. Saba valge, saba tipp must.



Suurus Väike, aga mustlagleest veidi suurem (1,5-2,5 kg), hanele iseloomulik kehakuju.

Häälitus „Kä-nkä-nkä“, suures parves kõlab see meloodilise naginana.

Sarnane liik Kanada lagle, kes on aga oluliselt suurem. Samuti on valgepösk-lagle pea peaaegu üleni valge, kanada laglel on valge laik aga ainult põsel ja kurgu all.



Foto: [Pixabay](#)




Photo credit: [Stefan Berndtsson](#) on [Visualhunt.com](#) / [CC BY](#)

7. MUSTLAGLE (*Branta bernicla*)

Sulestik

Üleni mustjashall. Valge sabapealne ja sabaalune. Täiskasvanud isenditel kaela küljel väike valge laik n-ö valge kaelus, mis musta pea ja kaela taustalt hästi esile tuleb.



- Suurus** Pardisuurune (1,1-1,7 kg), kael on lühike ja jäme. Hanele iseloomuliku keha hoia kuga.
- Häälitus** „rott-rott“, „prot-prot“ ja „kr-rop“
- Sarnane liik** Sarnaseid liike ei ole. Raskusi võib tekkida liigi määramisega alamliikide kohatise erineva sulestiku töttu.



Photo credit: [mikebaird](#) on [Visual Hunt](#) / CC BY




Photo credit: [Andrej Chudy](#) on [Visual Hunt](#) / CC BY-NC-SA

8. KANADA LAGLE (*Branta canadensis*)

Sulestik

Pea, kael, nokk ja saba on mustad, **põsed ja kurgualune ning sabaalused kattesuled valged**, küljed kollakaspruunid ning põikvöödilised. Rind on valkjas, kollaka varjundiga.



Suurus Lagledest suurim. Koduhane suurune, aga graatsilisem nagu luik.

Häälitsus „kä-kä-kä“, pasundav „oo-aank“

Sarnane liik Kaugelt võib kanada laglet ekslikult pidada mõneks haneks, kuid lähemal uurimisel eristub ta kergesti musta kaela ning pea poolest. Teistest lagledest on teda lihtne eristada sellepoolest, et ta on viimastest oluliselt suurem. Valgepõsk-laglest eristab kanada lagle veel see, et tal on ainult põsk valge, mitte peaaegu terve pea nagu valgepõsk-laglel.



j van cise photos

Photo credit: [j van cise photos](#) on [Visual hunt](#) / CC BY



Kanada lagled ja üksik hallhani

Photo credit: [Stefan Berndtsson](#) on [VisualHunt](#) / CC BY

Käesolev juhend on koostatud järgmiste linnumäärajate põhjal.

1. Valker, T. (2006) „Väike veelinnuraamat“, Maalehe Raamat.
2. Jonsson, L. (2000) „Euroopa linnud“, Eesti Entsüklopeediakirjastus, Tallinn.
3. Mägi, E. (2010) „101 Eesti lindu“, Varrak.
4. Väike-laukhane voldik www.piskulka.net/docs/EstoniaE1bookletAnnex14.pdf
5. Loodusõppe lehekülg
www.looduspilt.ee/loodusope/?page=liigitutvustused_list&filter=1&klass=4&selts=7

Jooniste ja fotode allikad.

- | | |
|--------------------|---|
| 1. hallhani | Pixabay; muudetud |
| 2. rabahani | BioDivLibrary on Visualhunt.com / CC BY; muudetud |
| 3. lühinokk-hani | Bas Kers (NL) on VisualHunt / CC BY-NC-SA; muudetud |
| 4. suur-laukhani | Freepik.com; muudetud |
| 5. väike-laukhani | rodtuk on Visual Hunt / CC BY-NC-SA; muudetud |
| 6. kanada lagle | Image by alphanumericlogic on Pixabay; muudetud |
| 7. mustlagle | BioDivLibrary on Visual Hunt / CC BY; muudetud |
| 8. valgepösk-lagle | BioDivLibrary on VisualHunt.com / CC BY; muudetud |
| 9. punakael-lagle | Free Public Domain Illustrations by rawpixel on Visual Hunt / CC BY; muudetud |